

El diagnóstico de la Ehrlichiosis, un reto para el veterinario

Un buen diagnóstico de Ehrlichiosis pasa por el hallazgo de una serie de signos clínicos y laboratoriales.

Signos clínicos:

- Fiebre, apatía, anorexia, pérdida peso.
- Linfadenopatía (solo 40 % casos).
- Espleno y hepatomegalia.
- Signos hemorrágicos: epistaxis, petequias, equimosis.
- Uveítis.

Signos laboratoriales:

- Anemia no regenerativa, trombocitopenia.
- Frotis sanguíneo: presencia de cuerpos de inclusión (requiere tiempo y experiencia y son frecuentes los falsos + y falsos -).
- Proteinograma alterado.
- Proteinuria y hematuria.
- **Detección de anticuerpos de Ehrlichia y/o Anaplasma en sangre circulante.**

Los signos característicos de Ehrlichiosis son a veces muy inespecíficos y necesitan ser confirmados mediante técnicas serológicas realizadas en la clínica o en el laboratorio.

Son frecuentes los casos subclínicos en los que los signos clínicos pasan desapercibidos. Estos casos son precisamente los más peligrosos porque al no ser diagnosticados, no se tratan y traen como consecuencia insuficiencias renales a medio - largo plazo que han tenido como origen una infección por Ehrlichia y/o Anaplasma meses o semanas atrás.